

セアカゴケグモに
ご注意ください!!



見ついたら素手でつかまおう!

ちわんちわん!

枚方市保健所 保健衛生課
電話 072-807-7624

私のプロポライール

私には 背中に赤い帯状の模様があります オスにはありません

私たちは “暖かい”ところが大好きです! 寒いところは苦手です

私たちは “卵のう” という袋に子どもを産みます

こどもは 1回あたり卵のうで3~5ヶ(500匹ほど)産まれます!

卵のう



実物大



メス…体長10mm程度

全体に黒く背に赤色の帯状の模様のあるのが特徴です

私たちのすみ家は1ページから!!
ご覧ください!

セアカゴケグモの雑学

- 本名は、節足動物部門クモ綱クモ目ヒメグモ科セアカゴケグモです。ちなみに学名は、*Latrodectus hasseltii*です。
- 寿命はほぼ1年と言われています。
- 出身は、オーストラリアニューージーランド等で、平成7年に大阪の高石市で発見されました。いわゆる“特定外来生物”です。
- オスは小さく、3mm位で特徴的な赤い模様がなく、白っぽく見えます。オスは小さいため人を咬むことはありません。



実物大

オス…体長3mm程度

もくじ

セアカゴケグモはこんな所にいる!!

住宅編

1P

セアカゴケグモはこんな所にいる!!

公園編

2P

自宅(施設)の周りの確認と駆除をするには

3P

もしもセアカゴケグモに咬まれたら...

4P

セアカゴケグモ



はこんな所にいる!!

住宅編

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| | 危険 | 生息数 多 (Many) |
| | 特に注意 | |
| | 注意 | |
| | 噛まれる危険性が高い | |

特に東・南側の日当りのいいところは注意

植木鉢の持ち手や裏・受け皿

外置きサンダル

2階のふとん

自動車のタイヤ周りやバンパーの裏

外置きのサンダル

犬小屋

室外機周辺

低木の下

グレーチングの裏

使っていない自転車

雨水マスや段差をなくす鉄板の裏


プリンターの持ち手や裏

セアカゴケグモ



はこんな所にいる!!

公園編



排水溝

自販機の裏

タイヤの内側

すべり台の裏

ベンチの裏

低木の下

枚方市
保健所 保健衛生課
電話 072-807-7624

自宅(施設)の周りのクモの駆除と確認をするには



1 見つけ方

クモの巣で見つけましょう

セアカゴケグモの巣



- ・落ち葉等を付けた不規則な巣(網)
- ・地面近くでかたい(粘りけの強い)糸

在来クモの巣



- ・糸だけのきれいな網状の巣
- ・空中にある巣、やわらかい糸

2 駆除作業の方法



ゴキブリ用スプレーなどを巣全体に吹きかけます



セアカゴケグモが飛び出したら、弱ったのを確認してふみ潰します



棒などで巣を取り出します



卵のう(卵の入った袋:直径約1cm)をふみ潰します



火気を使用する場合は、(できる)場合は、巣ごと燃やします

※ 使用後は、消火したことを確認しましょう。

もう一度、安全確認をしましょう
 生き残った子グモが大きくなった頃(2~3週間後)に、駆除したところを再確認しましょう



厚手の手袋(軍手など)
 必ず手袋をはめて!
 (薄手のゴム手袋は×)



ゴキブリ用殺虫スプレー(ヒレスロイド系)
 成虫に噴射します
 (卵のうには効果ありません)



草焼きバーナー
 巣ごと燃やせます
 (火の取り扱いには十分注意)



針金・さいばしなど
 巣の掻き出しなどに便利

準備物

もしもセアカゴケグモに咬まれたら...



咬まれた時の処置の仕方



万一、クモに咬まれたら...



傷口を流水で洗い、患部を冷やします。包帯や止血帯はしないほうがよいでしょう。



市販の家庭用殺虫剤（ゴキブリ用ピレスロイド系）でクモを殺します。



患部を冷やしながら、直ちに病院に行きましょう。乳幼児の場合は救急車を呼びましょう。

セアカゴケグモは強い毒性をもっています。攻撃性はなく、おとなしいクモです。素手でさわらない限り咬まれることはありません。

病院には、咬まれたクモを殺して持参した方が適切な治療につながります。

咬まれた時の症状

- 咬まれるとはじめはチクリと針で刺したような痛みを感じます。（すぐに痛みを感じないこともあります。）
- やがて咬まれた部分のまわりが腫れて赤くなります。痛みは次第に全身に広がることもあります。
- 悪化すると全身症状（吐き気、さむけ等）が現れることもあります。
- 通常は、数日から数ヶ月で回復する例が多いです。



枚方市

保健所 保健衛生課

電話 072-807-7624



セアカカゴケグモにご注意!!

セアカカゴケグモは強い毒を持っていますが、突かれると驚いて死んだまねをすするなど、攻撃性もなくおとなしいクモです。素手でさわらない限り咬まれることはありません。

見つけたら
素手でつかまわない
さわらない!



メス 体長約1cm 全体に黒く背に赤色の帯状の模様のあるのが特徴です。



卵のう (卵が入っている袋)

網を張って住みつき、繁殖するには次の条件が必要です。

- ① 日当たりが良く、暖かいところ
- ② 昆虫や小動物などのエサが豊富にあるところ
- ③ 巣を張る適なすき間があるところ

生息場所

■ 身近なところでは、次のようなところで発見されます。

- 排水溝のふた（グレーチング）の裏
- フランターの持ち手や裏、うつ伏せの空の植木鉢の中
- コンクリート壁の水抜き管の内部
- 墓石のすき間
- クーラー室外機、自動販売機、浄化槽プロアーカーカバーなどの人工的な熱源の周り

◆ 防除

- 生息しそうな場所では、クモのエサとなる昆虫等を駆除し、枯れ葉を掃除するなどしてクモが巣を作らないようにしましょう。
- これらの場所で作業する場合は、軍手や長そでを着用して咬まれないようにしましょう。
- 家庭用バーナー（火氣の使用がでる場所）による焼却、又は、市販の家庭用殺虫剤（ピレスロイド系）を直接噴霧すれば駆除できます。
- 卵のうは殺虫剤が効かないので、ふみ潰してください。

◆ 咬まれた時の症状

- 咬まれると、はじめはチクリと針で刺したような痛みを感じます。
- やがて咬まれた部分のまわりが腫れて赤くなります。痛みはだいに全身に広がる可能性があります。
- 悪化すると、多量の汗をかいたり、さむけ、はき氣などがあらわれられます。
- 通常は、数日から数ヶ月で回復する例が多く、咬まれても重症になることはほとんどありません。

◆ 咬まれた時の処置

- 万一口モに咬まれたら、余分な毒を流水や石けん水で洗い落とします。
 - 多少出血があっても、包帯や止血帯はしないほうがよいでしょう。
 - できるだけ早く病院に行って治療を受けることが大切です。
- (病院には、咬まれたクモを殺して持参してください。適切な治療につながります。)

■ お問い合わせ先

枚方市保健所 保健衛生課

〒573-0027 枚方市大垣内町2丁目2-2

電話 072-807-7624

【ホームページ】

枚方市 セアカカゴケグモ

検索